

DONZELLO franco-grossolana, fase ghiaiosa DNZ2

Distribuzione geografica e pedoambiente

L'orizzonte di alterazione è molto meno sviluppato ed è poco evidente, ha tessitura più sabbiosa. Elevata percentuale di ghiaie già nell'orizzonte superficiale (70%) di diametro 5-15 cm. Areale di pianura alluvionale, subpianeggiante con pendenze comprese tra 1 e 5%. Il substrato è costituito da depositi ghiaiosi di probabile pertinenza Stura, riconducibili al Fluvioglaciale e Fluviale Wurmiano e Post-wurmiano. Il substrato ghiaioso è direttamente osservabile nello scavo pedologico a partire da 60 cm. Il suolo si origina a partire da sedimenti palustri ricchi in materia organica che in alcuni casi sono sepolti di 80-100 cm da materiali alluvionali più recenti. Nelle zone dove questi affiorano alla superficie si è potuto sviluppare la coltivazione del prato stabile che ha contribuito a mantenere una situazione climax per questa tipologia di suolo. L'abbassamento delle falde nell'ultimo decennio e la progressiva sostituzione del prato stabile con seminativi sta portando alla graduale scomparsa dell'epipedon mollico con la perdita di elevate quantità di sostanza organica e del colore tipicamente scuro. L'uso del suolo attuale prevalente è caratterizzato da praticoltura, pioppicoltura e cerealicoltura (mais). I coltivi possono essere irrigati per scorrimento. Si consigliano bassi volumi di adacquamento per unità di tempo per evitare condizioni di eccessiva saturazione idrica. Il suolo è stato riconosciuto nelle seguenti unità cartografiche: U0479, U0481, U0507



Descrizione sintetica

Proprietà del suolo: Suoli con profondità utile di 50-60 cm per la presenza al di sotto di un 60% circa di ghiaie di diametro 6-10 cm. Permeabilità moderatamente bassa e drenaggio discreto con sviluppo di idromorfia già presente in superficie, ma più sviluppata a partire da 40-60 cm.

Profilo: Sono assai diffuse figure redox: screziature e concrezioni di ferro ossidato e ridotto. Le ghiaie sono presenti anche in superficie e sono alterate per l'azione insistente della falda superficiale che, nei periodi più piovosi, può risalire fino a 40-50 cm. Le tessiture sono franco-sabbiose e la reazione subacida nel topsoil, mentre nel subsoil prevalgono le tessiture sabbioso-franche e reazioni neutre. Capacità di scambio cationico medio-alta, grazie ad un buon contenuto in colloidi organici. Drenaggio discreto. Colore bruno-grigiastro molto scuro (10YR3/2).

Classificazione Soil Taxonomy: Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic

Legenda Carta dei Suoli: Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico)

Regime di umidità: Regime Aquico

Regime di temperatura: Regime Mesico

Descrizione del pedon rappresentativo

Profilo: MOND0027

Localizzazione: I FRATI - SANT'ALBANO

Pendenza: 0°

Esposizione: 0°

Uso del suolo: Mais, sorgo

Litologia: Ghiaie (75-20 mm)

Il suolo è stato descritto allo stato umido.

Orizzonte Ap : 0 - 40 cm; umido; colore bruno grigiastro molto scuro (10YR 3/2); tessitura franco sabbiosa; scheletro 70 % , di forma arrotondata con diametro medio di 50 mm e diametro massimo di 150 mm, leggermente alterato; radici 15/dmq, con dimensioni medie di 2 mm e dimensioni massime di 4 mm, orientamento obliquo; non adesivo; debolmente plastico; non calcareo; limite inferiore chiaro. Orizzonte Bwg : 40 - 60 cm; umido; colore grigio scuro (10YR 4/1); screziature 2 %, dominanti di colore bruno intenso (7,5YR 5/8), secondarie di colore bruno (7,5YR 4/4); tessitura sabbioso franca; scheletro 80 % , di forma arrotondata con diametro medio di 20 mm e diametro massimo di 100 mm, fortemente alterato; non adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore graduale. Orizzonte C : 60 - 80 cm; saturo; scheletro 90 % , di forma arrotondata, non alterato; non calcareo; limite inferiore non raggiunto.



Analisi chimico-fisiche del pedon rappresentativo

	Ap	Bwg
pH in H ₂ O	6.3	6.6
Sabbia grossolana %	29.9	67.4
Sabbia molto fine %	n.d.	n.d.
Limo grossolano %	13.5	3.5
Argilla %	6.6	5.3
CaCO ₃ %	.0	.0
C organico %	1.35	0.39
N %	0.23	0.05
C/N	5.9	7.8
Sostanza organica %	2.32	0.67
C.S.C. meq/100g	16.8	8.3
Ca meq/100g	13.0	9.8
Mg meq/100g	1.7	1.4
K meq/100g	n.d.	0.2
Na meq/100g	n.d.	n.d.
Fosforo assimilabile	n.d.	n.d.
Saturazione basica %	88	100

Orizzonti diagnostici riconosciuti

Epipedon mollico, orizzonte cambico.

Sequenza e variabilità degli orizzonti genetici

Ap-Bg-BgC. La tessitura varia nel subsoil in funzione dello sviluppo pedogenetico: da sabbioso-franca nel caso di orizzonti B appena accennati fino a franca nel caso di orizzonti B ben sviluppati. Parallelamente alla tessitura varia il contenuto in scheletro: in presenza di maggiori quantità di sabbia, lo scheletro è presente anche in superficie (20%) ed aumenta rapidamente oltre il 60% nel subsoil. Viceversa, dove la tessitura è più fine, lo scheletro è assente in superficie e intorno al 5-10% fino al limite inferiore dell'orizzonte B. I caratteri di idromorfia (screziature) possono essere evidenti fino dall'orizzonte superficiale oppure essere maggiormente concentrati nel subsoil.

Relazione con altre Fasi di suolo piemontesi

Non esistono relazioni con altre Fasi.

Data di aggiornamento

14/11/2024

Grado di fiducia

Iniziale

Origine e nome della fase**Note****Stima delle qualità specifiche**

Radicabilità

Disponibilità di ossigeno

Scarsa

Capacità in acqua disponibile (AWC)

90 mm

Rischio di incrostamento superficiale

Assente

Fertilità

Buona

Rischio di deficit idrico

Lieve rischio di deficit idrico

Lavorabilità

Scarsa

Tempo di attesa

Medio

Percorribilità

Scarsa

Capacità protettiva nei confronti delle acque di superficie

Capacità protettiva bassa ed alto potenziale di adsorbimento

Capacità protettiva nei confronti delle acque profonde

Capacità protettiva bassa e basso potenziale di adsorbimento

La massiccia presenza di scheletro diminuisce ulteriormente le già basse potenzialità protettive di questo suolo.

Attitudine allo spandimento dei liquami

Molto bassa

Capacità d'uso

Quarta Classe - sottoclasse s1

Alterazione delle proprietà chimico-fisiche:

Cenni sulla gestione di suoli:

n.i.: dato non indicato

n.d.: valore analisi non determinato