

Unità operativa 00016

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
25.00				
65.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da 4 delineazioni di forma allungata in direzione nord-est - sud-ovest, poste all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO), proprio nei pressi della città. La più grande come estensione comprende i rilievi sui quali sono presenti i laghi Sirio, Campagna, Pistono e Nero di Brgofranco.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologia molto caratteristica, formata da brevi versanti, posti su piccoli rilievi creati dalla erosione glaciale. Frequenti sono le rocce montonate. Molto particolare risulta essere la direzione prevalente di questi rilievi (nord-est/sud-ovest) quasi perpendicolare al percorso del ghiacciaio balteo. La litologia prevalente è caratterizzata da dioriti. Il suolo è per lo più occupato da bosco rado, con roverella e carpino nero. Da segnalare nel sottobosco l'abbondante presenza di pungitopo (*Ruscus aculeatus*).

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Humic Lithic Dystrudept hanno il contatto con la roccia entro i 50 cm di profondità e mostrano sulla superficie un orizzonte scuro, molto ricco di sostanza organica; i Typic Dystrudept sono più profondi e non hanno l'epipedon umbrico.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Dystrudept prevalgono nelle aree coperte da materiali di origine glaciale.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026