

Unità operativa 00020

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
10.00				
10.00				
70.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità è formata da 4 delineazioni di media estensione, che sono situate all'interno dell'anfiteatro morenico d'Ivrea, in sinistra e destra idrografica della Dora Baltea; in particolare a est e ovest di Ivrea (TO) e nei pressi di Strambino (TO) e Vische (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di una pianura intramorenica uniforme o leggermente ondulata, di poco rialzata sul livello del fiume. I sedimenti di origine sono in prevalenza calcarei, sabbioso-fini e limosi. L'uso del suolo vede il mais nettamente dominante rispetto alla praticoltura che fino a pochi decenni fa era la coltura principale di queste aree; sono anche da segnalare pioppeti e cereali autunno-vernini.

Caratteri differenziali dei suoli

I Fluvaquentic Endoaquoll sono caratterizzati da condizioni di idromorfia estrema; i Dystric Eutrudept sono invece primivi di segni di eccesso idrico, almeno nei primi orizzonti del suolo. Gli Aquic Hapludoll sono parzialmente idromorfi ed hanno un evidente orizzonte superficiale scuro (epipedon mollico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Fluvaquentic Eutrudept sono prevalentemente posti nei vecchi alvei abbandonati.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026