

Unità operativa 00021

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00				
50.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da 3 delineazioni relativamente poco estese, poste all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea, in sinistra e destra idrografica della Dora Baltea, nei pressi di Albiano d'Ivrea (TO) e Settimo Rottaro (TO) e a sud di Strambino (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologia caratterizzata da una pianura ondulata, spesso parzialmente depressa (paleoalvei), posta di frequente al contatto con il rilievo morenico che è in alcune situazioni la causa dell'impedimento del deflusso delle acque. I depositi di partenza sono attribuibili ad alluvioni medio-recenti calcaree, sabbioso fini o limose. L'uso attuale del suolo è prevalentemente caratterizzato da praticoltura, pioppicoltura e mais.

Caratteri differenziali dei suoli

I Fluvaquentic Endoaquoll sono caratterizzati da condizioni di idromorfia estrema; i Dystric Eutrudept sono invece primivi di segni di eccesso idrico, almeno nei primi orizzonti del suolo. Gli Aquic Hapludoll sono parzialmente idromorfi ed hanno un evidente orizzonte superficiale scuro (epipedon mollico). I Limnic Haplosaprist derivano da depositi organici (torbe) e sono caratterizzati dall'alternanza con materiali limosi di colore grigio e falda affiorante in alcuni mesi dell'anno.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Fluvaquentic Eutrudept sono prevalentemente posti nei vecchi alvei abbandonati. I Limnic Haplosaprist si concentrano nelle piccole aree depresse che rappresentano antiche superfici lacustri ora colmate.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026