

Unità operativa 00022

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00				
30.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 9 delineazioni di limitata estensione e di forma allungata parallelamente ai corsi d'acqua principali. In particolare questa Unità è presente in destra e sinistra idrografica dell'Orco, da Rivarolo canavese (TO) alla confluenza con il fiume Po, all'uscita della Valle Malone e in destra e sinistra del Sangone, tra Beinasco (TO) ed Orbassano (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è tipicamente quella di una pianura alluvionale terrazzata leggermente sopraelevata rispetto al corso dei fiumi, con alluvioni sabbiose e ghiaiose che provengono in prevalenza da litologie di partenze acide. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da mais in rotazione.

Caratteri differenziali dei suoli

I Dystric Eutrudept sono in prevalenza ghiaiosi e mostrano con meno evidenza l'alternanza di depositi alluvionali; i Fluventic Dystrudept hanno una minore presenza di ghiaie nei primi orizzonti e l'alternanza di depositi a granulometria differente è maggiormente evidente.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026