

Unità operativa 00037

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00				
20.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Due delineazioni non molto estese compongono questa Unità cartografica. Sono poste all'interno del rilievo morenico della Serra d'Ivrea nei pressi di Borgomasino (TO) e ad ovest di San Martino canavese (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Sono antichi scaricatori glaciali che hanno preso origine dalla successione delle pulsazioni (avanzata - ritirata - avanzata) del ghiacciaio balteo; in alcune situazioni si tratta di antiche superfici lacustri/palustri ormai prosciugate. I depositi di partenza sono di origine fluvio-glaciale e l'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura marginale verso il centro della forma e dal bosco misto di latifoglie sul bordo esterno.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Endoaquept hanno una idromorfia evidente entro i 40-50 cm mentre gli Oxyaquic Eutrudept sono parzialmente idromorfi oltre il mezzo metro di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Endoaquept sono frequenti al centro della forma, nelle aree più depresse.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026