

Unità operativa 00058

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
30.00				
10.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Un'unica delimitazione di limitata estensione forma questa Unità cartografica che è posta nel Biellese meridionale tra Cavaglià e Salussola.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia di questa Unità cartografica è molto complessa ed assai composita, malgrado l'esigua estensione territoriale. Si tratta di superfici fortemente ondulate, caratterizzate dal continuo alternarsi di dossi e avvallamenti, creati da depositi glaciali morenici (mindelliani) fortemente rimaneggiati dall'azione antropica; sono infatti frequenti i muretti a secco e le gradonature. L'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura marginale che si alterna a boschi di invasione; saltuariamente sono presenti frutticoltura e viticoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Aquic Hapludalf sono posti nelle aree pianeggianti, hanno un evidente orizzonte di illuviazione dell'argilla e condizioni di idromorfia almeno negli orizzonti profondi. I Typic Hapludalf sono spesso ricchi di scheletro, hanno un orizzonte argillico non sempre ben evidente e sono presenti sui dossi di origine glaciale. Gli Aquic Dystrudept hanno evidenti condizioni di idromorfia negli orizzonti profondi ma non mostrano segni di illuviazione dell'argilla. I Typic Dystrudept non sono affatto idromorfi e sono ricchi di scheletro.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Hapludalf dei rilievi morenici sono esclusivi delle aree di dosso. All'interno di questa Unità cartografica gli Aquic Dystrudept hanno tessiture al limite fra le tipologie a tessitura fine (qui descritte) e quelle a tessiture grossolane.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026