

Unità operativa 00096

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
10.00				
40.00				
25.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 7 delineazioni, alcune di estensione rilevante. Sono poste in Valle di Susa in sinistra idrografica della Dora Riparia, tra Barbonecchia (TO) e Giaglione (TO) e tra Chianocco (TO) e Condove (TO); in Valle Cenischia in destra idrografica del fiume, in Valle Chisone in sinistra idrografica, tra Fenestrelle (TO) e Villaretto (TO) e all'altezza di Perosa Argentina (TO); infine in Valle Germanasca nei pressi di Perrero (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Lunghi versanti da mediamente pendenti ed acclivi, con incisioni evidenti anche se non molto pronunciate, esposti prevalentemente a sud. Le litologie di partenza sono in maggioranza da attribuire a gneiss e micascisti; l'uso del suolo è costituito per metà da pascoli e prati e per metà da boschi condizionati dalla scarsa disponibilità idrica estiva. Le specie maggiormente presenti sono la roverella e il rovere alle quote più basse, il faggio, il pino silvestre e il larice in alto.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Udorthent, a differenza delle altre tipologie, non mostrano alcun orizzonte di alterazione; i Lithic Dystrudept hanno un contatto litico entro i 50 cm di profondità, gli Humic Dystrudept mostrano in superficie un orizzonte molto scuro e ricco di sostanza organica (epipedon umbrico); i Typic Dystrudept sono profondi e non hanno un orizzonte scuro in superficie o, se questo è presente, è comunque troppo sottile per essere definito come umbrico

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026