

Unità operativa 00097

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
10.00				
40.00				
25.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa Unità cartografica è formata complessivamente da 22 delineazioni di estensione non elevata. Sono situate nelle aree di spartiacque sulle cime circostanti Bardonecchia (TO), sullo spartiacque tra la Valle di Susa e la Valle Chisone, dall'altezza di Cesana (TO) fino a Gravere (TO); tra le Valli Chisone e Germanasca e, infine, al confine con la Francia nei versanti circostanti Punta Merciantaira e alle sorgenti del torrente Ripa.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è rappresentata dall'alternarsi di versanti poco o mediamente pendenti con pianori, fino a crinali evidentemente arrotondati; sono superfici poco incise ed uniformi che si sono sviluppate su litologie in prevalenza da attribuire ai calcescisti. L'uso del suolo è a prato-pascolo sulla maggior parte della superficie, boschi sono presenti nelle aree più basse in quota con una dominanza di conifere.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Haplocryoll hanno un evidente orizzonte scuro e ricco di sostanza organica sulla superficie (epipedon mollico), i Typic Eutrocryepts hanno un epipedon ocrico ed un orizzonte di alterazione (cambico) e sono saturi e, spesso, calcarei al contrario dei Typic Dystrocryepts che sono prevalentemente desaturati. I Typic Cryorthents non mostrano alcun orizzonte di alterazione.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

i Typic Haplocryoll sono maggiormente frequenti sulle aree meno acclivi.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026