

Unità operativa 00115

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
30.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 5 delineazioni che sono situate nelle montagne del Verbano, sui bassi versanti della Val Vigezzo, in sinistra del Torrente Toce, a monte di Domodossola e, infine, in destra della Val Cannobina nei pressi degli abitati di Trarego e Viggiona.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è tipicamente caratterizzata da versanti relativamente poco pendenti, a tratti intervallati da pianori senza contropendenza che si sono originati grazie all'antico modellamento glaciale. I materiali di partenza sono in parte di origine glaciale ed in parte derivanti da rocce silicatiche (soprattutto gneiss). L'uso del suolo è fondamentalmente a prato-pascoli, attualmente ancora in parte sfalciati, che si alternano a boschi faggete, boschi misti di latifoglie (aceri, frassino, castagno, faggio, rovere) o misti di latifoglie e conifere (abete bianco e rosso, larice e pino silvestre).

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Humic Dystrudept differiscono dai Typic Dystrudept per la presenza sulla superficie di un orizzonte molto scuro, ricco di sostanza organica (epipedon umbrico). Tra gli Humic Dystrudept, quelli dei conoidi montani si differenziano da quelli dei versanti per i materiali di origine che sono in maggioranza derivanti da alluvio-colluvio conseguente all'azione dei rii laterali.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Humic Dystrudept dei conoidi montani sono esclusivi delle aree di pianoro e delle zone influenzate dal deposito dei rii che scendono dai soprastanti versanti.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026