

Unità operativa 00137

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
35.00				
20.00				
5.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da 5 delineazioni di forma tendenzialmente allungata in direzione nord-sud, che sono posizionate nel Novarese settentrionale, tra i corsi dell'Agogna e del Ticino, tra Borgomanero (NO) e Bellinzago Novarese (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è quella dei terrazzi antichi con evidenti ondulazioni, posti però non al livello più elevato ma bensì ad un livello intermedio tra la pianura principale e le superfici più antiche. I depositi di partenza sono in parte alluvioni fluvio-glaciali ed in parte ricoprimenti di depositi glaciali. L'uso del suolo è caratterizzato da colture in rotazione, che sono nettamente dominanti rispetto a relitte aree a bosco.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Oxyaquic Hapludalf si differenziano dai Typic Hapludalf per le evidenti screziature di colore negli orizzonti profondi e per un drenaggio evidentemente più rallentato. I Typic Dystrudept, a differenza dei precedenti, non mostrano fenomeni di accumulo di argilla illuviale, sono meno evoluti ed hanno tessiture più grossolane.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Dystrudept sono posti sulle aree create da depositi di origine glaciale.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026