

Unità operativa 00164

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
25.00				
25.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica in oggetto è formata da quattro delineazioni di forma tendenzialmente allungata ed estensione relativamente ridotta. Sono situate sulle creste alpine torinesi tra la valle di Susa e la valle Chisone ed in Val Troncea. In particolare l'Unità è presente a nord di Sestriere (TO) e sulle creste poste in sinistra e destra idrografica del Chisone in Val Troncea.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di creste relativamente affilate, che si differenziano dai versanti sottostanti per un evidente cambio di pendenza. La litologia di partenza prevalente è riferibile ai calcescisti che però, nella maggior parte dei casi, hanno perduto il carbonato di calcio in conseguenza dell'alterazione superficiale subita. L'uso del suolo è caratterizzato dalla dominanza di praterie rupicole e pascoli, che si alternano agli affioramenti rocciosi e soprattutto alle scariche detritiche.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystrocryept sono desaturati ed acidi a differenza dei Typic Eutrochryept che sono tendenzialmente saturi e con reazione anche prossima alla neutralità. I Typic Cryorthent, a differenza dei precedenti, non mostrano alcun orizzonte di alterazione (cambico), quelli grossolani e calcarei si differenziano dai grossolani e non calcarei per la presenza, almeno nel subsoil, di carbonato di calcio.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Nelle aree meno stabili e costantemente influenzate da fenomeni colluviali sono prevalenti le tipologie riferibili ai Typic Cryorthent.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026