

Unità operativa 00165

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
65.00				
20.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica in oggetto è costituita da due delinearzioni che si situano sui bassi versanti montani all'imbocco della Valle Chisone e Lemina, a nord di Pinerolo (TO) e a nord-ovest di Bricherasio (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Per ciò che riguarda la morfologia si tratta di versanti debolmente pendenti ed incisi, di transizione ai conoidi pedemontani. Malgrado le pendenze non accentuate e le forme relativamente dolci è evidente l'influenza di processi erosivi attivi. La litologia è da segnalare per la sua peculiarità, almeno sul territorio regionale: sono gneiss minuti con abbondanza di pigmento grafítico (grafitoscisti). L'uso del suolo è dominato dal bosco, secondariamente prato-pascoli, coltivati in abbandono e rari frutteti o vigneti. Tra le specie forestali più frequenti il castagno, la rovere, la betulla e la robinia.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogenizzato (cambico) non presente nei Typic Udorthent che sono privi di qualsiasi orizzonte di alterazione. I Typic Hapludalf mostrano un orizzonte di accumulo di argilla illuviale (argillico) e, spesso, colori bruno rossastri.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Hapludalf sono maggiormente frequenti nelle aree di transizione ai conoidi ed agli antichi terrazzi fluviali, mentre i Typic Udorthent sono esclusivi delle aree più soggette ai fenomeni erosivi.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026