

Unità operativa 00168

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
30.00				
20.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica in oggetto comprende 12 delineazioni di limitata estensione territoriale che si pongono sui versanti alpini del Torinese e del Cuneese. In particolare le delineazioni si posizionano ad ovest di Cumiana (TO) sul monte tre Denti, in destra e sinistra idrografica del torrente Chisone all'altezza di Roreto Chisone (TO) e Meano (TO), in sinistra e destra Pellice all'altezza di Bobbio Pellice (TO), sul monte Bracco tra le valli Po e Ghiandone a sud di Barge (CN), in sinistra Varaita a nord di Sampeyre, infine una piccola delineazione rappresenta la Rocca di Cavour (TO), in celber montano all'interno della pianura torinese.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologia rappresentata da versanti molto pendenti con evidenti affioramenti rocciosi e scariche detritiche; sono aree fortemente incise dall'azione delle acque. Le litologie di partenza sono per la maggior parte riferibili a gneiss ghiandoni, gneiss minuti e micascisti (tutte rocce silicatiche). L'uso del suolo è in primo luogo caratterizzato da boschi pionieri di invasione e boscaglie, secondariamente sono presenti praterie rupicole e cespuglieti; non secondaria la presenza di detriti e affioramenti rocciosi. Tra le latifoglie si segnala la presenza di castagno, faggio e rovere (da sottolineare la diffusione del bagolaro sulla Rocca di Cavour), tra le conifere il larice ed il pino silvestre.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogenizzato (cambico) non presente nei Typic Udorthent che sono privi di qualsiasi orizzonte di alterazione. I Lithic Udorthent, oltre all'assenza di orizzonti di alterazione, presentano un contatto con la roccia inalterata (o poco alterata) entro i 50 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Dystrudept sono dominanti nelle porzioni più stabili dei versanti.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026