

Unità operativa 00171

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00				
20.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da tre delineazioni di estensione relativamente ridotta. Sono poste sui medi e bassi versanti alpini, nei pressi della testata di Comba Liussa, valle posta in destra idrografica rispetto al torrente Pellice all'altezza di Villar Pellice (TO); presso il confine tra le province di Torino e Cuneo, nella parte alta della valle del torrente Luserna, affluente di destra del Pellice e in una piccola delineazione in destra Maira a sud di Sampeyre (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologie di origine glaciale (circhi e versanti debolmente pendenti); si tratta in larga misura di aree sulle quali è stata notevole l'esarazione e la successiva deposizione da parte di ghiacciai. I materiali di partenza, di origine morenica, derivano in larga misura da rocce silicatiche: micascisti, gneiss minuti e gneiss ghiandoni. L'uso del suolo è a pascolo nelle aree a quota più elevata e a bosco rado di larice in quelle più basse; sono relativamente frequenti accumuli detritici con elementi anche di dimensioni metriche.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Spodic Dystrudept evidenziano un processo di podzolizzazione allo stato iniziale mentre gli Entic Haplorthod mostrano con evidenza, sia l'orizzonte eluviale (chiaro) sia l'orizzonte di accumulo di sesquiossidi di ferro e alluminio di colore aranciato.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Spodic Dystrudept sono presenti nelle aree più disturbate dai processi erosivi anche innescati dal passato pascolamento intensivo.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026