

Unità operativa 00172

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
55.00				
20.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica relativamente estesa che è composta da 9 delineazioni. Sono situate su versanti alpini del Torinese e del Cuneese: tra le valli Germanasca e Pellice, sullo spartiacque tra la valle Po e la val Pellice a nord di Crissolo (CN), in media valle Po in sinistra e destra idrografica all'altezza di Ostana (CN) e Oncino (CN), sul versante occidentale del monte Bracco ad est di Paesana (CN), in sinistra idrografica del Varaita a nord-est di Villar (CN) e a nord-ovest di Brossasco (CN) all'interno del vallone di Gilba, in destra idrografica del Varaita tra Frassinio (CN) e Sampeyre (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologia caratterizzata da versanti molto pendenti e fortemente incisi, impostati su litologie silicatiche (micascisti, gneiss minuti e gneiss ghiandoni). L'uso del suolo è per la maggior parte a bosco e secondariamente a pascolo. Tra le specie forestali si segnalano catagno, rovere e faggio alle quote inferiori, larice e abete bianco a quelle superiori.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Humic Dystrudept mostrano in profondità un orizzonte di alterazione (cambico) e in superficie un orizzonte ricco di sostanza organica e scuro (epipedon umbrico); i Typic Dystrudept non hanno tale orizzonte ma solo l'orizzonte di alterazione cambico; gli Spodic Dystrudept evidenziano la presenza della podzolizzazione con la formazione di un orizzonte in profondità dai colori aranciati.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026