

Unità operativa 00173

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
55.00				
25.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da un'unica delineazione di forma stretta e allungata, posta in val Chisoone all'altezza di Perosa Argentina (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Area di raccordo tra versanti e fondovalle caratterizzata da lieve pendenza; si tratta di brevi versanti incisi perpendicolarmente da alcuni rii laterali. I depositi di partenza sono di origine glaciale e sono riferibili in maggior parte a forme moreniche residuali costituite per la maggior parte da gneiss. L'uso del suolo è diviso tra i boschi di latifoglie nelle incisioni e sulle maggiori pendenze, da prati sfalciati e agricoltura residuale altrove. Da segnalare in alcune zone una urbanizzazione in espansione.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Humic Dystrudept hanno sulla superficie un orizzonte scuro, ricco di sostanza organica (epipedon umbrico) e un orizzonte di alterazione in profondità mentre i Typic Dystrudept hanno l'orizzonte di alterazione ma non l'epipedon umbrico. I Typic Udorthent, a differenza dei precedenti, non mostrano alcun orizzonte di alterazione.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

i Typic Udorthent sono maggiormente frequenti nelle aree a maggiore pendenza, più influenzate dai fenomeni erosivi.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026