

Unità operativa 00182

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
20.00				
15.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da cinque delineazioni di estensione ridotta che sono poste in sinistra idrografica della Valle di Susa nei pressi di Almese (TO) e Villar Dora (TO), al contorno del fondovalle della val Casternone, nell'incisione di maggiori dimensioni de terrazzo de La Mandria da Venaria (TO) a Fiano (TO) e nell'incisione del terrazzo della Vauda, tra Vauda C.se (TO) e Barbania (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di aree semipianeggianti di contatto e transizione con i versanti montani e di incisioni su antichi terrazzi fluviali. I depositi di partenza sono riferibili ad alluvioni medio-recenti con sovrapposti di depositi di origine colluviale prevalentemente provenienti da pietre verdi. L'uso del suolo è caratterizzato da agricoltura marginale con prati e coltivi in rotazione.

Caratteri differenziali dei suoli

I Dystric Eutrudept non hanno evidenti caratteri di idromorfia nei primi 60-80 cm di profondità mentre gli Oxyaquic Eutrudept mostrano entro i 60-80 cm evidenti screziature di colore. Gli Aquic Dystrudept, oltre a condizioni di idromorfia evidenziate da presenza di colori grigi (ferro ridotto) hanno anche una scarsa saturazione basica. Infine, a differenza delle tre tipologie precedenti, i Typic Hapludalf mostrano in profondità evidenti fenomeni di accumulo di argilla illuviale.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Hapludalf sono tipici delle aree meno soggette a fenomeni di nuovo apporto o asporto di materiali.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026