

Unità operativa 00187

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00				
20.00				
20.00				
10.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da un'unica delimitazione relativamente estesa che è situata a nord della città di Torino, tra la Stura di Lanzo e Brandizzo (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura leggermente ondulata con presenza di alcuni dossi che sono il residuo di una superficie più antica ormai quasi completamente smantellata. I materiali di partenza sono alluvioni fluvio -glaciali sabbiose e ghiaiose. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da seminativi (soprattutto mais) anche se l'espansione urbana (industriale e di infrastrutture viarie) è notevole.

Caratteri differenziali dei suoli

I Dystric Eutrodept non mostrano sulla superficie un orizzonte scuro e hanno in profondità un orizzonte di alterazione (cambico); i Fluvaquentic Hapludol e gli Aquic Hapludoll hanno un orizzonte scuro superficiale (epipedon mollico) e condizioni di idromorfia entro i 60-70 cm di profondità, i Fluvaquentic a differenza degli Aquic mostrano ancora evidentemente l'alternanza delle deposizioni. Infine gli Aquic Udifluent sono idromorfi entro i 60-70 cm ma non mostrano nè l'epipedon mollico, nè un orizzonte di alterazione cambico.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Aquic Udifluent sono maggiormente frequenti nelle aree più prossime ai corsi d'acqua principali.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026