

Unità operativa 00231

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
30.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica in oggetto è costituita da tre delineazioni di differente estensione. La più vasta si situa sulla parte meridionale dell'Altopiano di Poirino, a sud di Villastellone (To) e Poirino (To); le altre due sono poste nei pressi di Ceresole d'Alba (Cn) e Montà (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Incisioni più basse di alcuni metri in quota rispetto al livello della pianura principale o dei terrazzi antichi. I materiali di partenza sono riferibili ad alluvioni medio-recenti, ricche di sabbie, che derivano soprattutto dallo smantellamento delle colline impostate sul Villafranchiano. L'uso del suolo è caratterizzato da colture in rotazione e arboricoltura da legno (piooppo soprattutto). La posizione morfologica rende queste terre sostanzialmente marginali.

Caratteri differenziali dei suoli

I Fluventic Dystrudept derivano da depositi del Villafranchiano ricchi di quarzi, sono tendenzialmente acidi, a tessitura grossolana e hanno un orizzonte di alterazione (cambico) relativamente poco espresso; gli Oxyaquic Haplustept hanno tessiture più fini, una reazione tendente al subacido-neutro e un subsoil con colori ricchi di screziature che indicano un'influenza della falda. Gli Oxyaquic Haplustalf oltre alle screziature negli orizzonti profondi hanno anche un orizzonte di accumulo di argilla illuviale (argillico)

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Oxyaquic Haplustalf sono esclusivamente presenti nelle aree di dosso.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026