

Unità operativa 00233

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00				
25.00				
15.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da due delineazioni di forma stretta e allungata e di limitata estensione. Sono situate nella parte settentrionale dell'Altopiano di Poirino, a nord-est di Chieri (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di incisioni di fondivalle collinari, che comprendono anche lo sbocco in pianura. Si tratta di alluvioni e colluvi di piccoli corsi d'acqua laterali, che erodono e ridepongono materiali marnosi appartenenti al Terziario piemontese. L'uso del suolo è caratterizzato da agricoltura marginale con grano e mais in asciutta e praticoltura permanente asciutta; risulta essere in espansione l'arboricoltura da legno. Sono aree in parte pregiate per il tartufo bianco.

Caratteri differenziali dei suoli

I Fluventic Haplustept fini e calcarei si differenziano dai grossolani e calcarei per una presenza di argilla mediamente superiore al 18-20%; ambedue le tipologie pedologiche suddette hanno un orizzonte di alterazione (cambico) non molto evidente e l'alternanza delle deposizioni alluvionali ancora ben riconoscibile. Gli Oxyaquic Haplustept sono caratterizzati da un maggiore grado evolutivo e da presenza di evidenti screziature di colore negli orizzonti profondi che segnalano un drenaggio non ottimale. I Typic Haplustept, infine, hanno un orizzonte di alterazione ben espresso, non sono idromorfi entro 80 cm di profondità e sono prevalentemente decarbonatati.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Haplustept sono posti prevalentemente nella parte meridionale dell'Unità.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026