

Unità operativa 00234

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00				
20.00				
15.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica in oggetto è costituita da tre delineazioni di differente estensione territoriale che sono poste sull'Altopiano di Poirino. La più grande è situata all'estremo orientale dell'altopiano, da Buttigliera d'Asti (AT), a Villanova d'Asti (AT), fino a Valfenera (AT); la seconda per estensione è posta tra Chieri (TO) e Riva presso Chieri (TO), l'ultima rappresenta una limitata porzione territoriale tra le frazioni Savi e Bianchi a nord di Villanova d'Asti.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura ondulata ed incisa, posta ad un livello inferiore rispetto agli antichi terrazzi ma superiore rispetto alla pianura principale. I materiali di partenza sono riferibili ad alluvioni limose e sabbiose antiche; secondo alcuni autori esse sono riferibili ad antichi passaggi del fiume Po. L'uso del suolo è caratterizzato da colture in rotazione, tra queste dominano mais e grano.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Haplustalf e gli Inceptic Haplustalf hanno un evidente orizzonte di accumulo di argilla illuviale (argillico); gli Inceptic Haplustalf, a differenza dei Typic Haplustalf hanno un orizzonte argillico di spessore inferiore mediamente ai 30 cm. Gli Oxyaquic Haplustepts non mostrano evidenze di traslocazione d'argilla ma hanno un orizzonte di alterazione (cambico) che presenta evidenti screziature di colore, che divengono di colore grigio negli Aquic Haplustepts.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Oxyaquic Haplustepts e gli Aquic Haplustepts sono posti nelle aree più depresse dell'Unità.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026