

Unità operativa 00237

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
25.00				
20.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa Unità cartografica è costituita da due delineazioni che sono poste sull'Altopiano di Poirino, a sud del Banna, tra Isolabella (TO) e Valfenera (AT) e a nord del Banna nei pressi di Pessione (Fraz. di Chieri - TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta della superficie principale della pianura, a morfologia pianeggiante o leggermente ondulata. È un livello posto nettamente più in basso rispetto a terrazzi antichi ma più elevato rispetto alle adiacenti incisioni. I depositi sono relativamente antichi, di origine alluvionale e sono formate in prevalenza da materiali sabbiosi e limosi. L'uso del suolo è caratterizzato da colture in rotazione e dominanza di mais e praticoltura permanente non irrigua.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Aerici Endoaquept sono evidentemente idromorfi già a partire dal subsoil (entro i 40-50 cm); gli Aquici Haplustept mostrano caratteri di idromorfia entro i 70 cm di profondità ma non sono idromorfi subito al di sotto dell'orizzonte di aratura; gli Oxyaquici Haplustept hanno evidenti screziature di colore ma non hanno colori grigi entro 60-70 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Aerici Endoaquept sono maggiormente frequenti nella delineazione settentrionale.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026