

Unità operativa 00260

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00				
30.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da undici delineazioni che rappresentano i rilievi collinari a sud del Tanaro tra Isola d'Asti (At) e Mombercelli (At), tra Bra (Cn) e Isola d'Asti (At), i versanti bassi dell'area del Barolo fino ai rilievi collinari alessandrini nei pressi di Trisobbio (Al) e Moesasco (Al).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Sono rilievi collinari a dislivelli medio -bassi e pendenze poco accentuate. Il reticolo di drenaggio è nettamente meno complesso rispetto alle zone più ricche di sabbia poste a nord. Il substrato litologico è formato da Sabbie di asti e Argille di Lugagnano. In realtà i depositi sono prevalentemente ricchi di limi. Sono aree coperte per la maggior parte da viticoltura anche di pregio. Nei fondivalle cerealicoltura in asciutta e arboricoltura con pioppo.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Ustorthent fini hanno contenuto in argilla mediamente superiore al 18-20%, rispetto ai Typic Ustorthent grossolani. I Typic Haplustept, a differenza dei precedenti, sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte di alterazione (cambico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Ustorthent grossolani sono localizzati nella parte alta dei versanti collinari. I Typic Haplustept si posizionano nelle aree sulle quali la viticoltura - e le conseguenti operazioni di scasso preparatorie - ha avuto minore influenza.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026