

Unità operativa 00284

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00				
25.00				
25.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità è costituita da quattro delineazioni che attraversano il corso del torrente Grue e del torrente Curone estendendosi nel territorio dei comuni di Volpedo (Al) Pozzol Groppo (Al), Monleale (Al) , Montemarzino (Al), Avolasca (Al), Costa Vescovato (Al), Montegioco (Al) , Casasco (Al), Brignano Frascata (Al) e Monperone (Al). Una delineazione è presente a nord del Tanaro nei pressi di Rivarone (Al).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è caratterizzata da versanti collinari da debolmente a moderatamente acclivi con prevalente esposizione nord-est . Il substrato è costituito da marne e da silts argillosi e calcarei . L'utilizzo è quasi totalmente agrario con agricoltura frammentata caratterizzata da un'alternanza di viticoltura, cerealicoltura, frutticoltura e numerose superfici a prato.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Haplustept sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw):la caratteristica fondamentale del Calcic Haplustept è rappresentata dall' abbondanza di concentrazioni di carbonato di calcio dalla profondità di circa 80 cm mentre nei Typic Haplustept le concentrazioni sono scarse o assenti. I Typic Haplustert hanno un caratteristico colore scuro del topsoil e profonde crepacciature nella stagione secca mentre i Typic Usthorment sono non evoluti con colore chiaro tipico del substrato marnoso su cui si originano.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Nella delineazione più settentrionale sono meno frequenti i Vertisuoli e più presenti i Calcic Haplustept.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026