

Unità operativa 00288

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00				
20.00				
15.00				
15.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Due delineazioni relativamente estese costituiscono questa Unità cartografica. La più settentrionale è posta in alta Valle Po, a nord di Ostana (Cn), l'altra si posiziona tra Sampeyre (Cn) e Ostana (Cn), tra i corsi dei fiumi Po e Varaita.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di alti versanti, caratterizzati da pendenze relativamente modeste e da una uniformità del profilo molto evidente, con una morfologia differente dalle aree circostanti più acclivi. I litotipi più diffusi sono gneiss e micascisti. L'uso del suolo è per più di metà costituito da prato-pascoli e pascoli rupicoli; meno di un quarto dell'Unità è occupata dal bosco con dominanza del larice; nelle zone a più bassa quota è rilevabile il bosco di invasione e alneti di ontano verde.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Humic Dystrudept hanno sulla superficie uno spesso orizzonte scuro derivante dall'accumulo di sostanza organica (epipedon umbrico) mentre i Typic Dystrudept hanno un orizzonte più chiaro o un orizzonte scuro di spessore inferiore a circa 10 cm. I Typic e gli Spodic Dystrcryept sono posti alle quote superiori, i secondi si differenziano dai primi per la presenza evidente del fenomeno di podzolizzazione e consequenter formazione parziale di un orizzonte spodico.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic e gli Spodic Dystrcryept sono presenti oltre i 1900-2000 metri di quota in conseguenza di un regime di temperatura cryico.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026