

Unità operativa 00289

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
30.00				
20.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da due delineazioni di differente estensione. La più estesa è posta nei pressi dell'imbocco della Valle Po, in destra idrografica, da sud di Paesana (Cn) a sud di Gambasca (Cn); l'altra è posta in valle Bronda nei dintorni di Brondello (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Paesaggio caratterizzato da rilievi montuosi a pendenze intermedie, solcati da incisioni fortemente pronunciate che hanno portato alla formazione di una continua alternanza di versanti, creste e piccole valli che tagliano trasversalmente il versante principale. Il substrato litologico è prevalentemente costituito da gneiss e micascisti. Sono aree quasi per la totalità coperte da bosco (circa l'80% della superficie) con dominanza di latifoglie (castagno e faggio).

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Udorthent non mostrano alcun orizzonte di alterazione in profondità a differenza delle altre tipologie presenti. I Typic Dystrudept hanno un evidente orizzonte di alterazione strutturato e con sviluppo di colore e profondità superiore a 50 cm; gli Humic Dystrudept hanno un orizzonte scuro in superficie, arricchito in sostanza organica; i Lithic Dystrudept hanno un contatto con il substrato roccioso entro i 50 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Lithic Dystrudept sono posti in prossimità degli affioramenti rocciosi, i Typic Udorthent all'interno delle aree maggiormente influenzate da fenomeni erosivi superficiali.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026