

Unità operativa 00291

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00				
10.00				
10.00				
10.00				
25.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 11 delinearzioni relativamente poco estese che si situano sulle Alpi cuneesi, in media e alta val Varaita e in alta val Maira.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti uniformi a pendenze medie o medio-elevate, relativamente poco incisi dal reticolo drenante. Le litologie di partenza sono riferibili in maggioranza ai calcescisti, secondariamente ai micascisti. L'uso del suolo è per due terzi costituito dal prato-pascoli, la restante parte da macereti (alte quote) e bosco (basse quote); tra le specie forestali che sono soprattutto conifere, si segnala il larice come dominante.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystricrypt sono caratterizzati da reazione acida e dalla presenza di un orizzonte sottosuperficiale pedogenizzato (cambico) che ha sviluppato struttura e colore; i Typic Haplocryoll hanno reazione subacida o neutra e hanno in superficie un orizzonte scuro, ricco di sostanza organica e saturo di cationi; i Lithic Cryorthent hanno un contatto con la roccia a profondità inferiori a 50 cm e non mostrano orizzonti genetici profondi poichè la pedogenesi è ad un livello iniziale. I Typic Dystrudept sono caratterizzati da un regime di temperatura mesico in quanto situati alle quote inferiori.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Dystrudept sono esclusivamente presenti ad una quota inferiore ai 1800-1900 m s.l.m. I Typic Haplocryoll sono posti su superfici poco pendenti con affioramenti di calcescisti.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026