

Unità operativa 00292

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00				
25.00				
25.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 6 delineazioni ad estensione relativamente ridotta che sono situate in alta valle Varaita nei pressi di Pontechianale (Cn) e casteldelfino (Cn) e su parte dello spartiacque Varaita-Maira a nord di Stroppa (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di versanti montani da mediamente a molto pendenti, caratterizzati da una notevole instabilità superficiale; frequenti sono infatti le colate detritiche e gli asporti di materiali. Le litologie di partenza sono riferibili per la maggior parte ai calcescisti. L'uso del suolo è soprattutto costituito da prato-pascoli e praterie rupicole che si alternano ad aree coperte da detriti; il bosco rado di conifere è presente alle quote inferiori.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Cryorthent 'calcarei' e 'non calcarei' non mostrano alcun orizzonte di alterazione in profondità (cambico) e si differenziano tra loro per la presenza o l'assenza di carbonato di calcio nel subsoil. I Typic Haplocryoll sono prevalentemente saturi di cationi, calcarei e, soprattutto, hanno un orizzonte spesso e scuro in superficie (epipedon mollico). I Typic Eutrocrypte hanno un orizzonte di alterazione cambico ma in superficie non hanno un orizzonte suro che raggiunga i requisiti di spessore e di colore dell'epipedon mollico.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Haplocryoll sono concentrati nelle zone caratterizzate da minori pendenze nelle quali è stato possibile l'accumulo di materia organica.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026