

Unità operativa 00294

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
25.00				
30.00				
25.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica in oggetto ha un intervallo di quota assi rilevante ed è costituita da 4 delineazioni, una delle quali di estensione relativamente importante. Sono situate sulle Alpi cuneesi, in alta Val Varaita nei pressi di Prazzo (Cn), tra le valli Varaita e Grana e tra le valli Grana e Stura di Demonte ad ovest di Valloriate (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Paesaggio caratterizzato da versanti montani a pendenze medio-elevate, incisi da numerosi rii laterali che si sono approfonditi poco rispetto al profilo del versante. La litologia di partenza è riferibile soprattutto ai calcescisti. Si tratta di aree prevalentemente a bosco che, nelle esposizioni migliori e sulle pendenze meno accentuate, hanno ancora un utilizzo pascolivo. Frequenti i cespuglieti. Tra le conifere si segnala la presenza di abete bianco e larice, tra le latifoglie del faggio.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystrudept hanno un evidente orizzonte pedogenizzato (cambico) ma non hanno un orizzonte superficiale scuro, ricco di sostanza organica (epipedon umbrico) che è tipico degli Humic Dystrudept. I Typic Dystricrocept hanno un regime di temperatura cryico e mostrano un orizzonte di alterazione (cambico) che ha sviluppato struttura e colore a differenza dei Typic Cryorthent che ne sono privi.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Dystricrocept e i Typic Cryorthent si situano alle quote superiori (maggiori a 1800 m s.l.m.).

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026