

Unità operativa 00296

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
20.00				
15.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Un'unica delineazione di estensione rilevante costituisce l'Unità cartografica. E' posta sulle montagne cuneesi, tra le valli Grana e Maira, da Bernezzo (Cn) a Stroppio (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Paesaggio costituito da rilievi montuosi con pendenze medie e dislivelli poco accentuati, il reticolo drenante è orientato in tutte le direzioni. Le litologie di partenza sono per lo più riferibili a dolomie e calcari dolomitici. L'uso del suolo è per la maggior parte a bosco con dominanza netta del faggio (e del castagno alle quote più basse) sulle altre specie forestali.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Entic Hapludoll hanno un orizzonte superficiale fortemente arricchito in sostanza organica e scuro (epipedon mollico) e sono calcarei; i Lithic Udorthent non hanno in superficie un orizzonte con i requisiti dell'epipedon mollico e non hanno, in profondità, alcun orizzonte di alterazione definibile come cambico, il contatto litico è inoltre situato entro i 50 cm di profondità. I Typic Dystrudept sono acidi e mostrano in profondità evidenze di pedogenesi (sviluppo di struttura e di colore) ma senza presenza di argilla illuviale che è invece tipica dei Typic Hapludalf che, inoltre, sono da leggermente a mediamente calcarei.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Hapludalf sono concentrati nelle aree più prossime alla pianura mentre i Typic Dystrudept si concentrano nelle porzioni territoriali dove la litologia non è riferibile a calcari o dolomie ma a rocce silicatiche.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026