

Unità operativa 00297

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
25.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 4 delineazioni relativamente poco estese che si pongono in due aree ben distinte delle Alpi cuneesi. La prima area (2 delineazioni) è situata tra le valli Grana e Maira in prossimità dello sbocco in pianura; la seconda (due delineazioni) in val Tanaro ad ovest e ad est di Bagnasco (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Paesaggio costituito da bassi versanti a pendenze moderate, spesso di transizione alle superfici semi-pianeggianti di fondovalle. Sono leggermente incisi da un complesso reticolo drenante che incide un substrato formato da dolomie e calcari dolomitici. L'uso del suolo, quasi totalmente forestale, è prevalentemente caratterizzato da castagneti da frutto in parte abbandonati ed invasi da altre pecie forestali, in parte ancora conservati; da segnalare la presenza di residui prati sfalciati.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Entic Hapludoll mostrano in superficie un orizzonte spesso e scuro, in conseguenza dell'accumulo di sostanza organica (epipedon mollico). I Typic Hapludalf 'calcarei' si differenziano da quelli 'neutro-subalcalni' per la presenza (almeno nel subsoil) di calcare nel suolo. I Typic Hapludalf neutro-subalcalini inoltre hanno colori rossi e tessiture mediamente più fini, che possono essere anche comprese nella classe argillosa del triangolo granulometrico.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Hapludalf neutro-subalcalini sono prevalentemente posti nelle aree più prossime alla pianura.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026