

Unità operativa 00299

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
20.00				
15.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da tre delineazioni; la più estesa si situa sullo spartiacque tra le valli Grana e Maira sui versanti e sulle creste comprese tra castelmagno (Cn) e Prazzo (Cn). Le altre due di dimensioni nettamente inferiori sono poste a nord di Castelmagno (Cn) e a sud di Monterosso Grana (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di versanti uniformi, da debolmente a mediamente pendenti che comprendono anche alcune creste arrotondate; sono aree all'apparenza molto stabili e poco incise dai corsi d'acqua. Per ciò che riguarda la litologia del substrato sono i calcescisti a dominare. L'uso del suolo è adibito soprattutto al pascolo; boschi prevalentemente di larice sono posti sui medi versanti, alle quote inferiori è presente il faggio.

Caratteri differenziali dei suoli

I Dystric Eutrocept si differenziano esclusivamente perchè sono caratterizzati da un regime di temperatura mesico e non cryico in quanto posti alle quote inferiori. I Typic Eutrocept hanno un orizzonte di alterazione (cambico) ed una saturazione in basi superiore al 60% almeno in un orizzonte compreso tra 25 e 75 cm di profondità; i Typic Dystriccept hanno l'orizzonte di alterazione ma sono più desaturati dei precedenti. Gli Spodic Dystriccept mostrano nel profilo evidenze di podzolizzazione (colore aranciato e struttura soffice).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Spodic Dystriccept e i pochi Typic Haplocryod di cui si accenna in nota sono soprattutto rilevabili nei pressi di Grangia Cerreto. I Dystric Eutrocept sono posti a quote inferiori ai 1800 - 1900 metri s.l.m.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026