

Unità operativa 00302

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00				
20.00				
20.00				
20.00				
5.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 6 delineazioni. La più estesa rappresenta l'altopiano della Gardetta che è situato in alta Val Maira. Le altre 5 delineazioni sono poste nei dintorni della precedente e sono comprese tra la sinistra idrografica dell'alta valle Stura di Demonte, la testata della Valle Grana e la destra idrografica dell'alta val Maira.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta dal punto di vista della morfologia di ampi pianori glaciali d'alta quota; sono caratterizzati da un profilo 'morbido' e in alcune porzioni territoriali da pendenze assai esigue. Questa Unità è circondata da rilievi con versanti quasi verticali. Litologie prevalentemente costituite da dolomie e calcari dolomitici, intercalati da affioramenti di rocce acide: quarziti, filladi, porfidi; sono aree molto complesse dal punto di vista geologico. L'uso del suolo è pressoché totalmente adibito al pascolo.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystrocryept sono desaturati e hanno un orizzonte di alterazione sottosuperficiale che mostra sviluppo di colore e di struttura (cambico), i Typic Eutrocryept posseggono anch'essi un orizzonte cambico ma mediamente hanno una saturazione in basi maggiore del 60%. I Typic Cryorthent sono poco evoluti e non hanno alcun orizzonte di alterazione in profondità mentre i Typic Haplocryoll mostrano in superficie un orizzonte arricchito in sostanza organica (mollico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Cryorthent si posizionano nelle aree caratterizzate da maggiore instabilità superficiale.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026