

Unità operativa 00333

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00				
25.00				
20.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica che rappresenta due porzioni di pianura poste a nord di Mondovì (CN) e nei pressi di Bene Vagienna (Cn), tra i terrazzi di Salmour e del Beinale.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superfici pianeggianti con pendenza lieve da sud a nord - est, caratterizzate da ondulazioni evidenti anche se poco accentuate. Sono formate da alluvioni fluviali ricche di limi e sabbie fini che spesso presentano materiali provenienti dagli antichi terrazzi soprastanti. Terre ad utilizzo agrario con dominanza della praticoltura permanente e della maiscoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Endoaquept hanno l'orizzonte di alterazione (cambico) e presentano caratteri di forte idromorfia entro i 40/50 cm di profondità. Gli Aeric Endoaquept hanno colore bruno o bruno giallastro nel 50% o più della matrice entro i 70/80 cm di profondità, i Fragic Endoaquept hanno orizzonti con caratteri di fragipan in qualche orizzonte del profilo. Gli Aquic Dystric Eutrudept hanno l'orizzonte di alterazione (cambico) e presentano screziature grigie entro circa 60 cm dalla superficie del suolo. Gli Oxyaquic Fraglossudalf hanno un orizzonte con evidenti tracce di illuviazione di argilla (argillico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Oxyaquic Fraglossudalf e i Fragic Endoaquept sono prevalentemente presenti nella delineazione più meridionale.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026