

Unità operativa 00348

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00				
15.00				
25.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita dall'ampio versante posto a ovest di La Morra (CN) che collega i rilievi del Barolo con il corso del fiume Tanaro e da una piccola area in destra Bormida all'altezza di Castino (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti collinari impostati prevalentemente su strati a franapoggio a pendenza da debolmente a moderatamente acclive, solcati da alcune incisioni di non rilevante entità. I dislivelli sono moderatamente elevati e l'esposizione prevalente è a ovest. Il substrato è formato da depositi marnosi con elevate quantità di argille, intercalati ad arenarie. L'uso del suolo è caratterizzato da viticoltura prevalente (una parte dell'area è compresa all'interno del Docg del Barolo) con cerealicoltura non irrigua e prati e boschi nelle incisioni.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Haplustept sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw); si distinguono in fini e grossolani a seconda che le percentuali di argilla siano maggiori o minori del 18%. I Typic Ustorthent non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario e sono calcarei. Gli Haplic Ustarent sono legati alle lavorazioni profonde che si compiono prima dell'impianto dei vigneti, e mostrano un evidente rimescolamento degli orizzonti. Ad esclusione degli Haplustept grossolani, tutti questi suoli hanno tessiture con elevato contenuto di argilla (>18%).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026