

Unità operativa 00352

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00				
30.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra Belbo da San Benedetto Belbo (CN) a Cossano Belbo (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti a franapoggio a pendenza moderata con incisioni dovute al reticolo drenante. Il substrato è caratterizzato da intecalazioni arenaceo- marnose (Formazione di Cassinasco) con inclinazione evidente degli strati in direzione ovest/nord-ovest. L'uso del suolo è costituito da agricoltura marginale con praticoltura, cerealicoltura in asciutta, corilicoltura e poca viticoltura, che si alterna a bosco nelle incisioni.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Haplustept sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw); essi si distinguono in grossolani, che hanno tessiture con un ridotto tenore di argilla (< 18%), e in fini, che presentano elevato contenuto di argilla (>18%). I Typic Haplustalf fini sono suoli ben evoluti con espressione di un orizzonte con illuviazione di argilla (Bt) che presentano tessiture sempre con percentuali di argilla superiori al 18% e sono non calcarei. Infine i Typic Ustorthent grossolani sono suoli non evoluti e calcarei che hanno colori che poco si differenziano da quelli del substrato da cui si originano e che presentano argilla sempre inferiore al 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026