

Unità operativa 00359

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
20.00				
15.00				
10.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra Bormida da Saliceto (CN) a Cortemilia (CN), fino al confine con la Liguria.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti e rilievi collinari caratterizzati da notevole pendenza ma da una discreta uniformità. Malgrado la pendenza i fenomeni erosivi non paiono essere così pronunciati in conseguenza della fitta e persistente copertura boschiva. Il substrato è costituito da bancate di arenarie con rare intercalazioni marnose ed immersione degli strati prevalente in direzione nord-ovest (Formazione di Monesiglio).

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Haplustept grossolani sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw) e hanno tessiture con un ridotto tenore di argilla (< 18%); si differenziano in Typic, che sono calcarei e Dystric, che non lo sono a seguito di processi di decarbonatazione. I Typic Haplustalf, invece, sono suoli ben evoluti con espressione di un orizzonte con illuviazione di argilla (Bt), presentano tessiture grossolane e sono non calcarei. Infine i Typic Ustorthent sono suoli giovani e privi di evoluzione pedogenetica che mostrano colore e caratteristiche simili al substrato da cui si originano.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026