

Unità operativa 00364

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00				
20.00				
20.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Destra e sinistra idrografica del rio Valla, affluente di destra del Bormida di Spigno dal confine con la Liguria fino a Spigno Monferrato (AL), e in destra idrografica del torrente Corsaglia, affluente del Tanaro, nel territorio dei comuni di Bagnasco (CN) e Mombasiglio (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi collinari di transizione a rilievi montuosi con ripidi versanti. I versanti sono incisi non profondamente dai processi erosivi ed i dislivelli sono intermedi. Il substrato è costituito da conglomerati poligenici con elementi generalmente poco grossolani, associati ad arenarie grossolane (Formazione di Molare). Uso del suolo è caratterizzato sulla quasi totalità della superficie da bosco di latifoglie e pino silvestre; tra le latifoglie sono frequenti castagno e roverella (ceduo).

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Hapludalf sono suoli evoluti con evidente illuviazione di argilla; quelli ghiaiosi e magnesiaci presentano anche abbondante scheletro costituito da numerosi ciottoli (numerose le pietre verdi), mentre i grossolani e non calcarei ne sono privi. I Dystric Eutrudept grossolani mostrano un orizzonte di alterazione di colore con formazione di struttura, mentre i Typic Udorthent grossolani sono privi di evoluzione pedogenetica e sono calcarei.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026