

Unità operativa 00378

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
15.00				
30.00				
10.00				
10.00				
35.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Fascia trasversale che si estende da San Sebastiano Curone (AL) fino al corso del Borbera, all'altezza di Borghetto di Borbera (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi collinari con versanti fortemente acclivi, dall'aspetto quasi montuoso, relativamente poco incisi, posti a quote più elevate rispetto ai rilievi circostanti. Si osservano frequenti fenomeni gravitativi in atto. Il substrato è caratterizzato da un'alternanza di arenarie, argille marnose e marne. L'uso del suolo è quasi esclusivamente a bosco di latifoglie a causa delle elevate pendenze; solo sporadiche porzioni sui versanti meglio esposti e meno acclivi sono occupate da un'agricoltura marginale.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Haplustept fini sono caratterizzati da una debole evoluzione pedogenetica e da tessiture con percentuali di argilla generalmente superiori al 18% (fini) e più raramente inferiori al 18% (grossolani); possono essere calcarei e non calcarei. I Dystric Haplustept grossolani sono decarbonatati e hanno sempre percentuali di argilla inferiori al 18%. Nelle porzioni più erose si trovano i Typic Ustorthent molto poco evoluti con tessiture franco limose e sempre calcarei.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026