

Unità operativa 00398

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00				
20.00				
20.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da due delineazioni. La prima di forma stretta ed allungata è posta in sinistra idrografica rispetto al torrente Gesso, a nord delle terme di Valdieri (Cn); la seconda è invece situata presso lo spartiacque tra Pesio e Vermenagna, presso Bric Costa Rossa.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti montani complessi, caratterizzati da frequenti incisioni e da numerosi rii laterali. Le forme sono arrotondate e morbide e le pendenze poco accentuate soprattutto se poste in paragone con i rilievi più meridionali; evidente in alcune porzioni territoriali l'influenza della genesi glaciale. Le litologie di partenza sono riferibili a gneiss che si alternano a depositi morenici fortemente modellati dall'erosione. La copertura è quasi totalmente a bosco con prati-pascoli alle quote superiori. Si alterna la faggeta alle quote più basse con boschi di conifere verso le creste. Non sono rare pietraie ormai stabilizzate.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Entic Haplorthod mostrano con evidenza i segni della podzolizzazione e un orizzonte spodico ben espresso di colore aranciato (a tratti con lingue scure verticali) e consistenza soffice. Gli Spodic Dystrudept sono evidentemente influenzati dal medesimo processo pedogenetico ma non posseggono tutte le caratteristiche necessarie alla classificazione tra gli Spodosuoli. I Typic Haplocryod sono spodosuoli con regime di temperatura cryico e non mesico.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Haplocryod sono Spodosuoli posti oltre i 1900-2000 metri di quota.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
00405	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026