

Unità operativa 00406

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00				
20.00				
15.00				
15.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da tre delinearzioni che sono situate nelle Alpi cuneesi meridionali, in particolare tra la valle Gesso e la valle Stura di Demonte tra Valdieri (Cn) e Demonte (Cn) e in destra idrografica del torrente Gesso nei pressi di Entracque (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti montani, mediamente incisi ma, almeno sulla maggioranza delle superfici, abbastanza uniformi. Le pendenze sono moderate. Le litologie di partenza sono da riferire a Calcari marmorei, arenacei e conglomeratici; in linea generale è un'area dalla grande variabilità geologica (vi sono inclusioni ridotte di litologie silicatiche). L'uso del suolo è prevalentemente forestale con dominanza della faggeta, sono presenti anche castagno e roverella alle quote inferiori, nonché popolamenti di conifere.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Calciudoll si differenziano dai Typic Haprendoll per la presenza entro 100 cm di un orizzonte calcico evidente; ambedue le tipologie suddette mostrano un orizzonte superficiale scuro ricco di sostanza organica e saturo di cationi (epipedon mollico); i Typic Eutrudept grossolani non hanno in superficie un orizzonte analogo ma posseggono in profondità un orizzonte di alterazione cambico con sviluppo di colore e struttura. A differenza dei precedenti i Typic Eutrudept calcici hanno un orizzonte con accumulo di carbonati secondari entro 100 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Da approfondire anche se pare evidente la maggior presenza di tipologie con orizzonte calcico sui versanti esposti a sud.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026