

Unità operativa 00412

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00				
30.00				
20.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica di estensione complessiva ampia, formata da 7 delineazioni. Sono poste sui versanti delle Alpi cuneesi meridionali; in particolare in destra idrografica della valle Vermenagna, in sinistra Pesio, in media valle Corsaglia nei pressi di Bossea (Cn), in ala valle Casotto e Mongia, in alta valle Tanaro a nord di Ormea (Cn) e ad est di Garesio (Cn) presso il confine ligure.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi e versanti montani caratterizzati da medie pendenze e da una discreta stabilità superficiale. Le litologie di partenza sono da riferire a porfiroidi, quarziti ed in genere a rocce silicatiche che formano suoli acidi. Il bosco copre la maggioranza di queste superfici: al castagneto, tipico delle basse quote, si sostituisce la faggeta verso le zone alpine e pascoli ancora utilizzati dal bestiame alle quote maggiori.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Humic Dystrudept si differenziano dai Typic per la presenza in superficie di un orizzonte di colore scuro, molto ricco in sostanza organica (epipedon umbrico). Gli Spodic Dystrudept mostrano evidenze del processo di podzolizzazione con un orizzonte profondo di colore aranciato e consistenza soffice. Gli Entic Haplorthod mostrano la classica alternanza di colori (nero-bianco-rosso) dovuti alla discesa di complessi humo-ferrosi.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Entic Haplorthod sono maggiormente presenti nelle delineazioni meridionali e occidentali (valle Pesio)

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026