

Unità operativa 00421

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00				
25.00				
15.00				
10.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Una sola delineazione di estensione limitata compone la presente Unità cartografica che è posta prevalentemente in destra idrografica rispetto al corso del fiume Tanaro, a sud di Bagnasco (Cn) nei pressi del confine con la Liguria.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi montani a medie pendenze e medi dislivelli che appaiono comunque relativamente molto incisi dall'azione erosiva delle acque. Le litologie di partenza sono per lo più riferibili a calcari e dolomie con inclusioni di scisti argillosi. Il bosco misto di latifoglie copre sostanzialmente la totalità della superficie, frequenti sono acero,iglio, frassino; da sottolineare la concomitante presenza di carpino nero e carpino bianco.

Caratteri differenziali dei suoli

Il Typic Hapludalf è un suolo evoluto che mostra al suo interno lo sviluppo di pedogenesi con fenomeni di illuviazione di argilla (orizzonte argillico) e di decarbonatazione e presenta colori rossastri. I Typic Eutrudept non posseggono un orizzonte argillico ma evidenze di pedogenesi e decarbonatazione parziale o totale. I Lithic e typic Udorthent non hanno segni di evoluzione pedogenetica evidenti, i primi hanno un contatto con la roccia posto a profondità inferiori a 50 cm.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Sulle minori pendenze e le aree più stabili vi sono i Typic Hapludalf, nelle aree in forte erosione dominano i Typic e Lithic Udorthent.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026