

Unità operativa 00422

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
30.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da due delineazioni presenti tra Cherasco (Cn) e Bra (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Porzioni di pianura poste ad un livello nettamente inferiore rispetto alla pianura principale. Si tratta di una parte dell'antico alveo fluviale del Tanaro. Il substrato litologico è formato da alluvioni limose e sabbiose parzialmente calcaree. Sono aree con un uso del suolo ad agricoltura intensiva con alternanza di prati, erbai e cereali. Il mais è dominante.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Oxyaquic Haplustept hanno l'orizzonte di alterazione (cambico) ed hanno segni di idromorfia a partire da circa 80 cm di profondità: quelli calcarei si distinguono da quelli non calcarei per la presenza del carbonato di calcio nel profilo pedologico. I Typic Endoaquept hanno l'orizzonte di alterazione (cambico) ed hanno segni di idromorfia a partire da circa 40 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Oxyaquic Haplustept calcarei sono maggiormente diffusi nella delineazione più settentrionale.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026