

Unità operativa U0027

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	BNT1	BEINETTE limoso-grossolana, fase tipica	Dystric Eutrudept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	BNT2	BEINETTE limoso-grossolana, fase sepolta	Dystric Eutrudept, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica delineazione situata nella pianura cuneese occidentale, tra i corsi del Maira e del Varaita, tra Costigliole di Saluzzo (CN), Villafalletto (CN) e Monsola (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologicamente si tratta del primo tratto di pianura successivo al conoide pedemontano del Maira, rappresentativo delle aree maggiormente risparmiate dall'erosione. Sia la scarpata di terrazzo orientale che quella occidentale, tutte e due di probabile pertinenza Maira, sono caratterizzate da un dislivello non sempre riconoscibile dalle fotografie aeree ma abbastanza evidente sul terreno. L'uso del suolo è soprattutto cerealicolo e la frutticoltura è presente solo in piccola parte.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli bruno giallastri, a tessitura franca, non ghiaiosi e non calcarei (Fase tipica) che possono essere stati sepolti da depositi più recenti di colore grigiastro e, in qualche caso, calcarei (Fase sepolta).

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza in superficie di sedimenti recenti, grigiastri, a volte calcarei: BEINETTE sepolta 1 Assenza in superficie di sedimenti recenti, grigiastri, a volte calcarei: BEINETTE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato un modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026