

Unità operativa U0040

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo non associato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	PLC1	PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
40.00	ZUC1	ZUCCHEA franco-grossolana, fase tipica	Typic Udifluent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da delineazioni di forma allungata, poste nella pianura cuneese occidentale, in destra e sinistra idrografica della valle Varaita, all'imbocco della pianura, nei comuni di Piasco e Venasca (CN), fino oltre Scarnafigi (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di superfici terrazzate di poco più elevate in quota dell'alveo straordinario del fiume e leggermente più basse rispetto alla pianura principale. La morfologia superficiale è tipicamente ondulata in conseguenza dei recenti passaggi del fiume. L'uso del suolo non è uniforme poiché sono contemporaneamente presenti frutticoltura, praticoltura, cerealicoltura ed arboricoltura da legno.

Caratteri differenziali dei suoli

La PELLICE CHISONE tipica è caratterizzata da abbondanza di scheletro già nell'orizzonte sottosuperficiale, da tessiture prevalentemente sabbiose o sabbioso-franche e da colori bruno scuri, la ZUCCHEA tipica da scarsa presenza di scheletro fino a circa un metro di profondità, da tessiture franco-sabbiose e da colore bruno oliva.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Ghiaie abbondanti in prossimità della superficie, tessiture sabbiose o sabbioso-franche: PELLICE CHISONE tipica
 Ghiaie abbondanti oltre i 60 cm, tessiture franco-sabbiose: ZUCCHEA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La PELLICE CHISONE tipica è prevalentemente posta nei pressi del corso d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0043	U0043 ha una dominanza della ZUCCHEA tipica.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026