

Unità operativa U0047

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	BDA1	BORMIDA franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		
20.00	TAN1	TANARO scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Ustifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

L'unità cartografica è costituita da alcune delineazioni di cui una decorre parallelamente al corso del fiume Bormida fra Acqui Terme (AL) e Castellazzo Bormida (AL) e le restanti lungo il fondovalle dell'affluente laterale presente nel territorio comunale di Orsara Bormida (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

L'unità descrive il primo terrazzo alluvionale del fiume Bormida e di uno dei suoi affluenti. Si tratta di una superficie pianeggiante, piuttosto ondulata, in parte interessata dagli eventi alluvionali del fiume Bormida. I suoli, poco evoluti, si sviluppano su profondi depositi alluvionali a matrice sabbiosa e calcarea. L'uso del suolo è dominato dalla coltivazione del pioppo, che permette buoni risultati produttivi grazie alle favorevoli condizioni pedologiche e morfologiche.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BORMIDA sono Entisuoli privi di ghiaie nel primo metro di profondità mentre i suoli TANARO sono assai ghiaiosi e posizionati in prossimità dell'alveo.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 assenza di ghiaie: BORMIDA tipica 1 presenza abbondante di ghiaie nel subsoil: TANARO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0622	La U0622 si differenzia per la presenza della fase CASSINE tipica.
U1014	La U1014 si differenzia per la presenza della fase CASSINE tipica.
U1013	La U1013 si differenzia per la presenza dei suoli SARDEGNA tipica.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026