

Unità operativa U0055

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	CRV1	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
60.00	CRV2	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità che identifica porzioni di pianura poste in destra ed in sinistra Stura, poco a sud della confluenza con il Tanaro, nei pressi degli abitati di Cherasco (CN) e Bra (CN). L'unità è costituita da 2 delineazioni cartografiche differenti. La prima, in destra Stura, coincide per intero con un'unità morfologica che rappresenta uno dei livelli di terrazzi compresi tra Stura e Tanaro. La seconda ubicata in sinistra Stura nei pressi di Bra (CN). Esse rappresentano due porzioni di quella che era la un'unica unità morfologica prima del taglio operato dallo Stura.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

In sinistra Stura l'unità è presente al bordo orientale della pianura, nei pressi Bra (CN) prima della scarpata di raccordo con il livello attuale dello Stura. In destra del fiume l'unità cartografica è posta sulla parte di pianura risparmiata dall'erosione fluviale, dove sorge Cherasco. Quest'unità morfologica è situata ad un livello più alto di circa 60 metri rispetto al corso attuale del fiume.

Caratteri differenziali dei suoli

Il substrato è caratterizzato da depositi ghiaiosi molto alterati di probabile pertinenza Stura con un'influenza del Tanaro in alcune situazioni. Si tratta di Alfisuoli che presentano un profilo caratterizzato da un colore Munsell variabile da 10YR negli orizzonti più superficiali, fino a 7.5YR nell'orizzonte Bt. Le ghiaie nella maggior parte dei casi si trovano nel subsoil (fase tipica) ma possono essere già abbondanti nell'orizzonte superficiale (fase ghiaiosa). Cerealicoltura e praticoltura sono gli usi del suolo prevalenti

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di scheletro abbondante entro i 40 cm di profondità CERVERE ghiaiosa 1 Assenza di scheletro abbondante entro i 40 cm di profondità: CERVERE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli maggiormente ghiaiosi sono presenti verso l'orlo dei terrazzi.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0065	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026