

Unità operativa U0058

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	BRN2	BRANZOLA limoso-grossolana, fase di conoide, asciutta	Typic Udorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
45.00	MNT2	MONTANERA scheletrico-sabbiosa, fase di conoide, asciutta	Typic Udorthent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
5.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 6 piccole delineazioni situate in sinistra Stura tra Fossano (CN) e Roreto di Cherasco (CN), al contatto con la scarpata di raccordo alla piana di Cervere (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Piccole conoidi formate dal colluvio di abbondante materiale, proveniente dalla scarpata che raccorda il livello dello Stura con la piana alta di Cervere. La pendenza di queste aree può essere causa di innesco di fenomeni erosivi a carico degli orizzonti superficiali del suolo. L'uso del suolo è in parte a bosco, in particolare sulle pendenze più elevate ed in parte cerealicolo.

Caratteri differenziali dei suoli

Si tratta di suoli non evoluti a causa dei continui processi erosivi in atto. I depositi posti ai piedi della scarpata sono costituiti dal colluvium dei livelli marnosi che la costituiscono mentre nella porzione più bassa di questi colluvi sono presenti i depositi ghiaiosi di pertinenza dello Stura.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di scheletro lungo il profilo: MONTANERA di conoide 1 Assenza di scheletro lungo il profilo: BRANZOLA di conoide

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0501	U0501 è però caratterizzata da maggiori pendenze e da affioramenti frequenti del substrato terziario (marne in prevalenza).

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026